

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez uczniów klas z programem nauczania **matematyki na poziomie rozszerzonym** poszczególnych śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych

Nazwa realizowanego programu: MATeMATyka - Program nauczania matematyki dla liceum(czteroletniego)/technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek, wydawnictwo: Nowa Era.

Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W).

- Wymagania **konieczne (K)** dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny być opanowane przez każdego ucznia.
- Wymagania **podstawowe (P)** zawierają wymagania z poziomu (K) wzbogacone o typowe problemy o niewielkim stopniu trudności.
- Wymagania **rozszerzające (R)**, zawierające wymagania z poziomów (K) i (P), dotyczą zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych.
- Wymagania **dopełniające (D)**, zawierające wymagania z poziomów (K), (P) i (R), dotyczą zagadnień problemowych, trudniejszych, wymagających umiejętności przetwarzania przyswojonych informacji.
- Wymagania **wykraczające (W)** dotyczą zagadnień trudnych, oryginalnych, wykraczających poza obowiązkowy program nauczania.

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

ocena dopuszczająca – wymagania na poziomie (K)

ocena dostateczna – wymagania na poziomie (K) i (P)

ocena dobra – wymagania na poziomie (K), (P) i (R)

ocena bardzo dobra – wymagania na poziomie (K), (P), (R) i (D)

ocena celująca – wymagania na poziomie (K), (P), (R), (D) i (W)

Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu rozszerzonego.

LICZBY RZECZYWISTE

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych oraz przyporządkowuje liczbę do odpowiedniego zbioru liczb
<input type="checkbox"/> rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze (proste przypadki)
<input type="checkbox"/> rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone
<input type="checkbox"/> stosuje cechy podzielności liczb
<input type="checkbox"/> podaje dzielniki danej liczby naturalnej
<input type="checkbox"/> znajduje największy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną wielokrotność liczb
<input type="checkbox"/> porównuje liczby wymierne
<input type="checkbox"/> podaje przykład liczby wymiernej zawartej między dwiema danymi liczbami oraz przykłady liczb niewymiernych
<input type="checkbox"/> zaznacza na osi liczbowej daną liczbę wymierną, odczytuje z osi liczbowej współrzędne danego punktu
<input type="checkbox"/> przedstawia liczby wymierne w różnych postaciach
<input type="checkbox"/> wyznacza przybliżenia dziesiętne danej liczby rzeczywistej z zadaną dokładnością (również przy użyciu kalkulatora) oraz oblicza błąd przybliżenia
<input type="checkbox"/> wyznacza rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych, zamienia ułamki dziesiętne o skończonym rozwinięciu dziesiętnym na ułamki zwykłe
<input type="checkbox"/> wykonuje proste działania w zbiorach liczb: całkowitych, wymiernych i rzeczywistych
<input type="checkbox"/> oblicza wartość pierwiastka dowolnego stopnia z liczby nieujemnej oraz wartość pierwiastka nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej
<input type="checkbox"/> wyłącza czynnik przed znak pierwiastka kwadratowego
<input type="checkbox"/> wykonuje działania na pierwiastkach tego samego stopnia, stosując odpowiednie twierdzenia
<input type="checkbox"/> usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu $\frac{1}{\sqrt{a}}$
<input type="checkbox"/> przekształca i oblicza wartości wyrażeń zawierających pierwiastki kwadratowe (proste przypadki)
<input type="checkbox"/> szacuje wartości liczb niewymiernych
<input type="checkbox"/> zapisuje i odczytuje liczbę w notacji wykładniczej
<input type="checkbox"/> oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych
<input type="checkbox"/> zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o wykładniku wymiernym
<input type="checkbox"/> zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o danej podstawie
<input type="checkbox"/> upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach (proste przypadki)
<input type="checkbox"/> porównuje liczby przedstawione w postaci potęg (proste przypadki)
<input type="checkbox"/> stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do prostych obliczeń
<input type="checkbox"/> wyznacza podstawę logarytmu lub liczbę logarytmowaną, gdy dana jest wartość logarytmu (proste przypadki)
<input type="checkbox"/> interpretuje pojęcia procentu i punktu procentowego
<input type="checkbox"/> oblicza procent danej liczby
<input type="checkbox"/> oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
<input type="checkbox"/> wyznacza liczbę, gdy dany jest jej procent

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> posługuje się procentami w rozwiązywaniu prostych zadań praktycznych |
|---|

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> stosuje ogólny zapis liczb naturalnych: parzystych, nieparzystych, podzielnych przez 3 itp. |
| <input type="checkbox"/> przedstawia liczbę naturalną w postaci iloczynu liczb pierwszych (trudniejsze przypadki) |
| <input type="checkbox"/> wykorzystuje dzielenie z resztą do przedstawienia liczby naturalnej w postaci $a \cdot k + r$ |
| <input type="checkbox"/> konstruuje odcinki o długościach niewymiernych |
| <input type="checkbox"/> wykonuje działania łączne na liczbach rzeczywistych (trudniejsze przypadki) |
| <input type="checkbox"/> zamienia ułamek dziesiętny okresowy na ułamek zwykły |
| <input type="checkbox"/> porównuje pierwiastki bez użycia kalkulatora |
| <input type="checkbox"/> wyznacza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki, stosując prawa działań na pierwiastkach |
| <input type="checkbox"/> wyłącza czynnik przed znak pierwiastka dowolnego stopnia, włącza czynnik pod znak pierwiastka dowolnego stopnia |
| <input type="checkbox"/> usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu $\sqrt[3]{a}$ |
| <input type="checkbox"/> upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach (trudniejsze przypadki) |
| <input type="checkbox"/> porównuje liczby przedstawione w postaci potęg (trudniejsze przypadki) |
| <input type="checkbox"/> stosuje twierdzenia o logarytmie iloczynu, ilorazu i potęgi do uzasadnienia równości wyrażeń |
| <input type="checkbox"/> oblicza, o ile procent jedna liczba jest większa (mniejsza) od drugiej |
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje złożone zadania tekstowe, wykorzystując obliczenia procentowe |

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących podzielności liczb |
| <input type="checkbox"/> udowadnia prawa działań na potęgach o wykładnikach naturalnych (całkowitych) |
| <input type="checkbox"/> dowodzi niewymierności niektórych liczb, np. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ |
| <input type="checkbox"/> dowodzi, że suma (iloczyn) liczby wymiernej i niewymiernej jest liczbą niewymierną |
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące liczb rzeczywistych |

JĘZYK MATEMATYKI

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> posługuje się pojęciami: zbiór, podzbiór, zbiór skończony, zbiór nieskończony |
| <input type="checkbox"/> opisuje symbolicznie dane zbiory |
| <input type="checkbox"/> wymienia elementy danego zbioru oraz elementy do niego nienależące |

<input type="checkbox"/> posługuje się pojęciem iloczynu, sumy oraz różnicy zbiorów
<input type="checkbox"/> zaznacza na osi liczbowej przedziały liczbowe
<input type="checkbox"/> wyznacza przedział opisany podanymi nierównościami
<input type="checkbox"/> wyznacza iloczyn, sumę i różnicę przedziałów liczbowych oraz zaznacza je na osi liczbowej
<input type="checkbox"/> rozwiązuje proste nierówności liniowe, sprawdza, czy dana liczba spełnia daną nierówność
<input type="checkbox"/> zaznacza na osi liczbowej zbiór rozwiązań nierówności liniowej
<input type="checkbox"/> zapisuje zbiory w postaci przedziałów liczbowych, np. $A = \{x \in \mathbf{R}: x \geq -4 \wedge x < 1\} = [-4; 1)$
<input type="checkbox"/> wyłącza wskazany jednomian przed nawias w sumie algebraicznej
<input type="checkbox"/> mnoży sumy algebraiczne przez siebie oraz redukuje wyrazy podobne w otrzymanej sumie
<input type="checkbox"/> zapisuje związki między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> stosuje wzory skróconego mnożenia do przekształcania wyrażeń algebraicznych w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> stosuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych do rozwiązywania prostych równań i nierówności
<input type="checkbox"/> oblicza wartość bezwzględną liczby rzeczywistej
<input type="checkbox"/> stosuje interpretację geometryczną wartości bezwzględnej liczby do rozwiązywania elementarnych równań i nierówności typu $ x - a \leq a$
<input type="checkbox"/> stosuje interpretację geometryczną wartości bezwzględnej liczby do rozwiązywania równań i nierówności typu $ x - 3 \leq 3$, $ x - 4 \leq 1$

Poziom **(R)** lub **(D)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

- wyznacza iloczyn, sumę i różnicę danych zbiorów oraz dopełnienie zbioru
- zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniających układ nierówności liniowych z jedną niewiadomą
- **wykonuje złożone działania na przedziałach liczbowych**
- zapisuje związki między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych \wedge przeprowadza dowody, stosując działania na wyrażeniach algebraicznych
- stosuje wzory skróconego mnożenia do przekształcania wyrażeń algebraicznych
- stosuje wzory skróconego mnożenia do wykonywania działań na liczbach $a \pm b \cdot c$
- usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu $\frac{a}{b \pm c \cdot d}$
- stosuje przekształcenia algebraiczne do rozwiązywania równań i nierówności (trudniejsze przypadki)
- stosuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym
- upraszcza wyrażenia algebraiczne, korzystając z własności wartości bezwzględnej

<ul style="list-style-type: none"> wyznacza przedziały liczbowe określone za pomocą wartości bezwzględnej wykorzystuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną typu $2x-3 \leq 5$, $3x-1 \leq 7$, $x^2 \leq 4x-4 \leq 2\sqrt{\quad}$ zaznacza w układzie współrzędnych zbiory punktów, których współrzędne spełniają warunki zapisane za pomocą wartości bezwzględnej wyprowadza wzory skróconego mnożenia

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

<input type="checkbox"/> formułuje i sprawdza hipotezy dotyczące praw działań na zbiorach
<input type="checkbox"/> dowodzi podzielności liczb w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/> stosuje wzory skróconego mnożenia do dowodzenia twierdzeń
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące zbiorów i własności wartości bezwzględnej

UKŁADY RÓWNAŃ

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> podaje przykładowe rozwiązania równania liniowego z dwiema niewiadomymi
<input type="checkbox"/> sprawdza, czy podana para liczb spełnia dany układ równań
<input type="checkbox"/> do danego równania dopisuje drugie równanie tak, aby rozwiązaniem była dana para liczb
<input type="checkbox"/> wyznacza wskazaną zmienną z danego równania liniowego
<input type="checkbox"/> rozwiązuje układy równań metodą podstawiania (proste przypadki)
<input type="checkbox"/> określa, ile rozwiązań ma dany układ równań w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> rozwiązuje układy równań metodą przeciwnych współczynników w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> stosuje układy równań liniowych do rozwiązywania prostych zadań tekstowych

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> zapisuje w postaci układu równań podane informacje tekstowe
<input type="checkbox"/> dobiera współczynniki liczbowe w układzie równań tak, aby dana para liczb była jego rozwiązaniem
<input type="checkbox"/> określa, ile rozwiązań ma dany układ równań
<input type="checkbox"/> dopisuje drugie równanie tak, aby układ był sprzeczny, oznaczony, nieoznaczony
<input type="checkbox"/> rozwiązuje układy równań w trudniejszych przypadkach, stosując przekształcenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia
<input type="checkbox"/> zapisuje rozwiązanie układu nieoznaczonego

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> stosuje układy równań do rozwiązywania zadań tekstowych, w tym zadań dotyczących prędkości oraz wielkości podanych za pomocą procentów: stężeń roztworów i lokat bankowych |
|---|

Poziom **(W)**

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące układów równań, np. układy równań z trzema niewiadomymi, układy równań z parametrem |
| <input type="checkbox"/> stosuje układy równań w trudniejszych zadaniach tekstowych |

FUNKCJE

Poziom **(K)** lub **(P)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> rozpoznaje przyporządkowania będące funkcjami
<input type="checkbox"/> określa funkcję różnymi sposobami (grafem, wzorem, tabelą, wykresem, opisem słownym)
<input type="checkbox"/> poprawnie stosuje pojęcia związane z pojęciem funkcji: dziedzina, zbiór wartości, argument, miejsce zerowe, wartość i wykres funkcji
<input type="checkbox"/> odczytuje z wykresu dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, najmniejszą i największą wartość funkcji (w przypadku nieskomplikowanego wykresu)
<input type="checkbox"/> odczytuje z wykresu wartość funkcji dla danego argumentu oraz argument dla danej wartości funkcji
<input type="checkbox"/> na podstawie nieskomplikowanego wykresu funkcji określa argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ujemne
<input type="checkbox"/> określa na podstawie wykresu przedziały monotoniczności funkcji
<input type="checkbox"/> wskazuje wykresy funkcji rosnących, malejących i stałych wśród różnych wykresów
<input type="checkbox"/> wyznacza dziedzinę funkcji określonej tabelą lub opisem słownym
<input type="checkbox"/> oblicza wartość funkcji dla różnych argumentów na podstawie wzoru funkcji
<input type="checkbox"/> odczytuje argument odpowiadający podanej wartości funkcji (w prostych przypadkach)
<input type="checkbox"/> sprawdza algebraicznie położenie punktu o danych współrzędnych względem wykresu funkcji danej wzorem
<input type="checkbox"/> wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji danej wzorem z osiami układu współrzędnych (w prostych przypadkach)
<input type="checkbox"/> rysuje w prostych przypadkach wykres funkcji danej wzorem
<input type="checkbox"/> posługuje się pojęciem wektora i wektora przeciwnego
<input type="checkbox"/> oblicza współrzędne wektora
<input type="checkbox"/> sporządza wykresy funkcji: $y = f(x \pm p)$, $y = f(x) \pm q$, $y = f(x \pm p) \pm q$, $y = -f(x)$, $y = f(\pm x)$ na podstawie danego wykresu funkcji $y = f(x)$
<input type="checkbox"/> sporządza wykres funkcji: $y = f(\pm x)$, jeśli ma dany wykres funkcji $y = f(x)$ (proste przypadki)
<input type="checkbox"/> stosuje funkcje i ich własności w prostych sytuacjach praktycznych
<input type="checkbox"/> wskazuje wielkości odwrotnie proporcjonalne
<input type="checkbox"/> stosuje zależność między wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi do rozwiązywania prostych zadań

<input type="checkbox"/>	wyznacza współczynnik proporcjonalności
<input type="checkbox"/>	podaje wzór proporcjonalności odwrotnej, jeśli zna współrzędne punktu należącego do wykresu
<input type="checkbox"/>	szkicuje wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$ dla danego $a > 0$ i $x > 0$

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/>	rozpoznaje i opisuje zależności funkcyjne w sytuacjach praktycznych
<input type="checkbox"/>	przedstawia daną funkcję na różne sposoby w trudniejszych przykładach
<input type="checkbox"/>	na podstawie wykresu funkcji określa liczbę rozwiązań równania $f(x) = m$ dla ustalonej wartości m
<input type="checkbox"/>	na podstawie wykresu funkcji odczytuje zbiory rozwiązań nierówności: $f(x) \leq m$, $f(x) < m$, $f(x) \geq m$, $f(x) > m$ dla ustalonej wartości m
<input type="checkbox"/>	odczytuje z wykresów funkcji rozwiązania równań i nierówności typu: $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$, $f(x) > g(x)$
<input type="checkbox"/>	szkicuje wykres funkcji spełniającej podane warunki oraz określonej różnymi wzorami w różnych przedziałach
<input type="checkbox"/>	wyznacza współrzędne początku lub końca wektora, jeśli ma dane współrzędne wektora i jednego z punktów
<input type="checkbox"/>	znajduje obraz figury w przesunięciu o dany wektor
<input type="checkbox"/>	zapisuje wzór funkcji, której wykres otrzymano w wyniku przesunięcia o dany wektor
<input type="checkbox"/>	szkicuje wykres funkcji będący efektem wykonania kilku operacji, jeśli ma dany wykres funkcji $y = f(x)$
<input type="checkbox"/>	sporządza wykres funkcji: $y = f(x)$, jeśli ma dany wykres funkcji $y = f(x)$
<input type="checkbox"/>	stosuje funkcje i ich własności w sytuacjach praktycznych, w tym proporcjonalność odwrotną, do rozwiązywania zadań dotyczących drogi, prędkości i czasu

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)-(D) oraz:

<input type="checkbox"/>	na podstawie definicji bada monotoniczność funkcji danej wzorem
<input type="checkbox"/>	monotoniczna w swojej dziedzinie x i udowadnia, że funkcja np. $f(x) = \dots$ nie jest
<input type="checkbox"/>	rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji

FUNKCJA LINIOWA

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu
<input type="checkbox"/> rysuje wykres funkcji liniowej danej wzorem
<input type="checkbox"/> oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu
<input type="checkbox"/> wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej
<input type="checkbox"/> oblicza współczynnik kierunkowy prostej, jeśli ma dane współrzędne dwóch punktów należących do tej prostej
<input type="checkbox"/> interpretuje współczynniki ze wzoru funkcji liniowej
<input type="checkbox"/> wyznacza algebraicznie oraz odczytuje z wykresu funkcji liniowej zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ujemne
<input type="checkbox"/> rozpoznaje wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne
<input type="checkbox"/> odczytuje z wykresu funkcji liniowej jej własności: dziedzinę, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność
<input type="checkbox"/> wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dane dwa punkty
<input type="checkbox"/> wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych
<input type="checkbox"/> sprawdza algebraicznie i graficznie, czy dany punkt należy do wykresu funkcji liniowej
<input type="checkbox"/> przekształca równanie ogólne prostej do postaci kierunkowej i odwrotnie
<input type="checkbox"/> sprawdza, czy dane trzy punkty są współliniowe
<input type="checkbox"/> stosuje warunek równoległości i prostopadłości prostych
<input type="checkbox"/> wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest równoległy do wykresu danej funkcji liniowej
<input type="checkbox"/> wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest prostopadły do wykresu danej funkcji liniowej
<input type="checkbox"/> rozwiązuje układ równań metodą algebraiczną i metodą graficzną
<input type="checkbox"/> określa liczbę rozwiązań układu równań liniowych, korzystając z jego interpretacji geometrycznej

Poziom **(R)** lub **(D)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> sprawdza, dla jakich wartości parametru funkcja liniowa jest rosnąca, malejąca, stała
<input type="checkbox"/> oblicza pole figury ograniczonej wykresami funkcji liniowych oraz osiami układu współrzędnych
<input type="checkbox"/> sprawdza, dla jakich wartości parametru dwie proste są równoległe, prostopadłe
<input type="checkbox"/> znajduje współrzędne wierzchołków wielokąta, gdy dane są równania prostych zawierających jego boki
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi
<input type="checkbox"/> opisuje za pomocą układu nierówności liniowych zbiór punktów przedstawionych w układzie współrzędnych
<input type="checkbox"/> rozwiązuje równania i nierówności liniowe z parametrem

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> stosuje własności funkcji liniowej do rozwiązywania zadań tekstowych osadzonych w kontekście praktycznym |
| <input type="checkbox"/> analizuje własności funkcji liniowej |

Poziom **(W)**

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> określa własności funkcji liniowej w zależności od wartości parametrów występujących w jej wzorze |
| <input type="checkbox"/> wykorzystuje własności funkcji liniowej w zadaniach dotyczących wielokątów w układzie współrzędnych |
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje układ równań z parametrem |
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji liniowej |
| <input type="checkbox"/> wyprowadza równanie prostej o danym współczynniku kierunkowym przechodzącej przez dany punkt |
| <input type="checkbox"/> udowadnia warunek prostopadłości prostych o danych równaniach kierunkowych |

PLANIMETRIA

Poziom **(K)** lub **(P)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> rozróżnia trójkąty: ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne |
| <input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie w prostych przypadkach |
| <input type="checkbox"/> sprawdza, czy z trzech odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt |
| <input type="checkbox"/> udowadnia przystawanie trójkątów, wykorzystując cechy przystawania (proste przypadki) |
| <input type="checkbox"/> wykorzystuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania prostych zadań |
| <input type="checkbox"/> udowadnia podobieństwo trójkątów, wykorzystując cechy podobieństwa (proste przypadki) |
| <input type="checkbox"/> zapisuje proporcje boków w trójkątach podobnych |
| <input type="checkbox"/> wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania elementarnych zadań |
| <input type="checkbox"/> sprawdza, czy dane figury są podobne |
| <input type="checkbox"/> oblicza długości boków figur podobnych |
| <input type="checkbox"/> stosuje w prostych zadaniach twierdzenie o stosunku pól figur podobnych |
| <input type="checkbox"/> wskazuje w wielokątach odcinki proporcjonalne |
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje proste zadania, wykorzystując twierdzenie Talesa |
| <input type="checkbox"/> udowadnia równoległość prostych stosując twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa |
| <input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie w prostych przypadkach |

Poziom **(R)** lub **(D)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> przeprowadza dowód twierdzenia o sumie miar kątów w trójkącie
<input type="checkbox"/> stosuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania trudniejszych zadań geometrycznych
<input type="checkbox"/> wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania praktycznych problemów i trudniejszych zadań geometrycznych
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące podobieństwa wielokątów
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania, wykorzystując twierdzenie Talesa
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie do rozwiązywania zadań

Poziom **(W)**

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

<input type="checkbox"/> przeprowadza dowód twierdzenia Talesa
<input type="checkbox"/> przeprowadza dowód twierdzenia o dwusiecznej kąta w trójkącie
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia i dowodzenia z zastosowaniem twierdzenia Talesa i twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Talesa
<input type="checkbox"/> stosuje własności podobieństwa figur podczas rozwiązywania zadań problemowych oraz zadań wymagających przeprowadzenia dowodu
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie w zadaniach wymagających przeprowadzenia dowodu
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące przystawania i podobieństwa figur

FUNKCJA KWADRATOWA

Poziom **(K)** lub **(P)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> szkicuje wykres funkcji $f(x) = ax^2$ i podaje jej własności
<input type="checkbox"/> sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy do wykresu danej funkcji kwadratowej
<input type="checkbox"/> szkicuje wykres funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i podaje jej własności
<input type="checkbox"/> ustala wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej na podstawie informacji o przesunięciach wykresu funkcji $f(x) = ax^2$
<input type="checkbox"/> przekształca wzór funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej do postaci ogólnej i odwrotnie
<input type="checkbox"/> oblicza wyróżnik trójmianu kwadratowego
<input type="checkbox"/> oblicza współrzędne wierzchołka paraboli, podaje równanie jej osi symetrii
<input type="checkbox"/> znajduje brakujące współczynniki funkcji kwadratowej, jeśli zna współrzędne punktów należących do jej wykresu
<input type="checkbox"/> rozwiązuje równania kwadratowe niepełne metodą rozkładu na czynniki oraz stosując wzory skróconego mnożenia

<input type="checkbox"/> określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od znaku wyróżnika
<input type="checkbox"/> rozwiązuje równania kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki
<input type="checkbox"/> wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych
<input type="checkbox"/> przedstawia trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej, o ile taka postać istnieje
<input type="checkbox"/> odczytuje miejsca zerowe funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej
<input type="checkbox"/> rozwiązuje nierówności kwadratowe
<input type="checkbox"/> rysuje wykres funkcji $y = f(x) $, gdy dany jest wykres funkcji kwadratowej $y = f(x)$

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> szkicuje wykres funkcji kwadratowej i podaje jej własności
<input type="checkbox"/> znajduje współczynniki funkcji kwadratowej, jeśli zna współrzędne punktów należących do jej wykresu
<input type="checkbox"/> znajduje współczynniki funkcji kwadratowej na podstawie informacji o jej własnościach, np. zbiorze wartości, maksymalnych przedziałach monotoniczności
<input type="checkbox"/> rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną
<input type="checkbox"/> znajduje iloczyn, sumę, różnicę zbiorów rozwiązań nierówności kwadratowych
<input type="checkbox"/> szkicuje wykres funkcji, który jest efektem wykonania dwóch przekształceń wykresu funkcji kwadratowej

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)-(D) oraz:

<input type="checkbox"/> przekształca na ogólnych danych wzór funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej
<input type="checkbox"/> wyprowadza wzory na współrzędne wierzchołka paraboli
<input type="checkbox"/> wyprowadza wzory na pierwiastki równania kwadratowego
<input type="checkbox"/> szkicuje wykres funkcji, który jest efektem wykonania więcej niż dwóch przekształceń wykresu funkcji kwadratowej
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji kwadratowej

ZASTOSOWANIA FUNKCJI KWADRATOWEJ

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> rozwiązuje równania kwadratowe, stosując poznane metody i wzory
<input type="checkbox"/> wyznacza argument, dla którego funkcja kwadratowa przyjmuje daną wartość
<input type="checkbox"/> przedstawia trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej i podaje jego pierwiastki

<input type="checkbox"/> rozwiązuje nierówności kwadratowe
<input type="checkbox"/> zaznacza na osi liczbowej iloczyn i różnicę zbiorów rozwiązań dwóch nierówności kwadratowych
<input type="checkbox"/> rozwiązuje równania dwukwadratowe
<input type="checkbox"/> rozwiązuje algebraicznie układ równań, z których jedno jest równaniem paraboli, a drugie równaniem prostej, i podaje interpretację geometryczną rozwiązania
<input type="checkbox"/> rozwiązuje algebraicznie układy równań, z których obydwa równania są równaniami parabol, i podaje interpretację geometryczną rozwiązania
<input type="checkbox"/> stosuje wzory Viète'a do wyznaczania sumy i iloczynu pierwiastków równania kwadratowego oraz do określania znaków pierwiastków trójmianu kwadratowego
<input type="checkbox"/> stosuje pojęcie najmniejszej i największej wartości funkcji, wyznacza w prostych przypadkach najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym
<input type="checkbox"/> przeprowadza analizę zadania tekstowego i znajduje w prostych przypadkach rozwiązanie, które spełnia ułożone przez niego warunki

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> rozwiązuje w trudniejszych przypadkach równania, które można sprowadzić do równań kwadratowych
<input type="checkbox"/> stosuje nierówności kwadratowe do wyznaczania dziedziny funkcji, w której wzorze występują pierwiastki kwadratowe
<input type="checkbox"/> rozwiązuje układy równań, z których co najmniej jedno jest równaniem paraboli, i podaje interpretację geometryczną rozwiązania w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/> zaznacza w układzie współrzędnych obszar opisany układem nierówności
<input type="checkbox"/> stosując wzory Viète'a, oblicza wartości wyrażeń zawierających sumę i iloczyn pierwiastków trójmianu kwadratowego
<input type="checkbox"/> układa równanie kwadratowe, którego pierwiastki spełniają określone warunki
<input type="checkbox"/> rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe z parametrem spełniające podane warunki
<input type="checkbox"/> wyznacza najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale domkniętym, korzystając z własności funkcji kwadratowej
<input type="checkbox"/> stosuje własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania tekstowe w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/> wyprowadza wzory Viète'a

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji kwadratowej, w tym zadania z parametrem
--

WIELOMIANY

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> podaje przykład wielomianu, określa jego stopień i podaje wartości jego współczynników
<input type="checkbox"/> zapisuje wielomian w sposób uporządkowany
<input type="checkbox"/> oblicza wartość wielomianu dla danego argumentu; sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu danego wielomianu
<input type="checkbox"/> wyznacza sumę, różnicę, iloczyn wielomianów i określa ich stopień
<input type="checkbox"/> szkicuje wykres wielomianu będącego sumą jednomianów stopnia pierwszego i drugiego
<input type="checkbox"/> określa stopień iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia
<input type="checkbox"/> podaje współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny iloczynu wielomianów, bez wykonywania mnożenia wielomianów
<input type="checkbox"/> stosuje wzory na sześcian sumy lub różnicy oraz wzory na sumę i różnicę sześciąt
<input type="checkbox"/> rozkłada wielomian na czynniki, stosując metodę grupowania wyrazów i wyłączania wspólnego czynnika poza nawias
<input type="checkbox"/> rozwiązuje proste równania wielomianowe
<input type="checkbox"/> wyznacza punkty przecięcia wykresu wielomianu i prostej w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> dzieli wielomian przez dwumian $x - a$
<input type="checkbox"/> sprawdza poprawność wykonanego dzielenia
<input type="checkbox"/> zapisuje wielomian w postaci $w(x) = p(x)q(x) + r$
<input type="checkbox"/> wyznacza wartość parametru tak, aby dane wielomiany były równe w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> sprawdza podzielność wielomianu przez dwumian $x - a$ bez wykonywania dzielenia
<input type="checkbox"/> sprawdza, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu, i wyznacza pozostałe pierwiastki
<input type="checkbox"/> określa, które liczby mogą być pierwiastkami całkowitymi lub wymiernymi wielomianu o współczynnikach całkowitych
<input type="checkbox"/> rozwiązuje równania wielomianowe z wykorzystaniem twierdzeń o pierwiastkach całkowitych i wymiernych wielomianu w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> wyznacza pierwiastki wielomianu i podaje ich krotność, gdy dany jest wielomian w postaci iloczynowej
<input type="checkbox"/> znając stopień wielomianu i jego pierwiastek, bada, czy wielomian ma inne pierwiastki, oraz określa ich krotność
<input type="checkbox"/> szkicuje wykres wielomianu, gdy dana jest jego postać iloczynowa
<input type="checkbox"/> dobiera wzór wielomianu do szkicu wykresu
<input type="checkbox"/> rozwiązuje nierówności wielomianowe, korzystając ze szkicu wykresu lub wykorzystując postać iloczynową wielomianu

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> opisuje wielomianem zależności dane w zadaniu, wyznacza dziedzinę i rozwiązuje zadanie tekstowe w prostych przypadkach |
| <input type="checkbox"/> oblicza wartość wielomianu dwóch (trzech) zmiennych dla danych argumentów |

Poziom **(R)** lub **(D)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> wyznacza współczynniki wielomianu spełniającego dane warunki |
| <input type="checkbox"/> określa stopień wielomianu w zależności od parametru |
| <input type="checkbox"/> oblicza sumę współczynników wielomianu |
| <input type="checkbox"/> stosuje wielomiany wielu zmiennych w zadaniach różnych typów; określa stopień wielomianu wielu zmiennych |
| <input type="checkbox"/> wykonuje działania na wielomianach w trudniejszych przypadkach |
| <input type="checkbox"/> stosuje wzory $a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + \dots + 1)$
oraz $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2} \cdot b + \dots + a \cdot b^{n-2} + b^{n-1})$ |
| <input type="checkbox"/> stosuje wzory $a^3 \pm b^3$ do usuwania niewymierności z mianownika |
| <input type="checkbox"/> rozkłada wielomian na czynniki możliwie najniższego stopnia |
| <input type="checkbox"/> stosuje rozkład wielomianu na czynniki w zadaniach różnych typów |
| <input type="checkbox"/> rozkłada dany wielomian na czynniki, stosując metodę podaną w przykładzie |
| <input type="checkbox"/> dzieli wielomian przez inny wielomian i zapisuje go w postaci $w(x) = p(x)q(x) + r(x)$ |
| <input type="checkbox"/> sprawdza podzielność wielomianu przez wielomian $(x - p)(x - q)$ bez wykonywania dzielenia |
| <input type="checkbox"/> dzieli wielomian przez dwumian $x - a$, stosując schemat Hornera |
| <input type="checkbox"/> wyznacza resztę z dzielenia wielomianu, gdy podane są określone warunki |
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje równania wielomianowe z wykorzystaniem twierdzeń o pierwiastkach całkowitych i wymiernych wielomianu w trudniejszych przypadkach |
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące pierwiastków wielokrotnych |
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje równania wielomianowe metodą grupowania wyrazów i wyłączając wspólny czynnik przed nawias w trudniejszych przypadkach |
| <input type="checkbox"/> szkicuje wykres wielomianu po wyznaczeniu jego pierwiastków |
| <input type="checkbox"/> stosuje nierówności wielomianowe do wyznaczania dziedziny funkcji zapisanej za pomocą pierwiastków |
| <input type="checkbox"/> wykonuje działania na zbiorach określonych nierównościami wielomianowymi |
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania z parametrem, korzystając z równań i nierówności wielomianowych |
| <input type="checkbox"/> opisuje za pomocą wielomianu objętość lub pole powierzchni bryły oraz określa dziedzinę powstałej w ten sposób funkcji; wykorzystuje równania wielomianowe w zadaniach dotyczących związków miarowych w prostopadłościanach |

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

<input type="checkbox"/> stosuje wzory skróconego mnożenia do dowodzenia twierdzeń
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania z parametrem o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące wyznaczania reszty z dzielenia wielomianu przez np. wielomian stopnia drugiego
<input type="checkbox"/> stosuje równania i nierówności wielomianowe do rozwiązywania zadań praktycznych o podwyższonym stopniu trudności
<input type="checkbox"/> przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących wielomianów, np. twierdzenia Bézouta, twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu
<input type="checkbox"/> przeprowadza dowód twierdzenia o dzieleniu z resztą wielomianu przez dwumian postaci $x - a$ (algorytm Hornera) w szczególnym przypadku

FUNKCJE WYMIERNE

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> szkicuje wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$ (w prostych przypadkach także w podanym zbiorze), gdzie $a \neq 0$, i podaje jej własności (dziedzinę, zbiór wartości, przedziały monotoniczności)
<input type="checkbox"/> przesuwa wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$, gdzie $a \neq 0$, o wektor, podaje jej własności oraz podaje równania asymptot jej wykresu
<input type="checkbox"/> podaje współrzędne wektora, o jaki należy przesunąć wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$, gdzie $a \neq 0$, aby otrzymać wykres $y = \frac{a}{x-p} + q$ w prostych przypadkach; szkicuje wykres funkcji $y = \frac{a}{x-p} + q$
<input type="checkbox"/> dobiera wzór funkcji do jej wykresu
<input type="checkbox"/> przekształca wzór funkcji homograficznej do postaci kanonicznej w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> wyznacza równania asymptot wykresu funkcji homograficznej, korzystając z jej postaci kanonicznej
<input type="checkbox"/> wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego
<input type="checkbox"/> oblicza wartość wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej
<input type="checkbox"/> upraszcza w prostych przypadkach wyrażenia wymierne
<input type="checkbox"/> wykonuje działania na wyrażeniach wymiernych w prostych przypadkach i podaje odpowiednie założenia
<input type="checkbox"/> rozwiązuje równania wymierne, podaje i uwzględnia odpowiednie założenia
<input type="checkbox"/> rozwiązuje, również graficznie, nierówności wymierne w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> wyznacza ze wzoru dziedzinę i miejsce zerowe funkcji wymiernej
<input type="checkbox"/> stosuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania prostych równań i nierówności wymiernych w prostych przypadkach

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania prostych zadań tekstowych |
|---|

Poziom **(R)** lub **(D)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> wyznacza równania osi symetrii i współrzędne środka symetrii hiperboli opisanej równaniem
<input type="checkbox"/> przekształca wzór funkcji homograficznej do postaci kanonicznej
<input type="checkbox"/> szkicuje wykresy funkcji homograficznych i określa ich własności w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/> wyznacza wzór funkcji homograficznej spełniającej podane warunki
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące funkcji homograficznej
<input type="checkbox"/> wyznacza równanie hiperboli na podstawie informacji podanych na rysunku
<input type="checkbox"/> szkicuje wykresy funkcji $y = f(x) $, $y = f(x)$, $y = f(x) $, gdzie f jest funkcją homograficzną, i opisuje ich własności
<input type="checkbox"/> wykonuje działania na wyrażeniach wymiernych, podaje odpowiednie założenia i zapisuje je w najprostszej postaci w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/> mnoży wyrażenia wymierne dwóch zmiennych i podaje konieczne założenia
<input type="checkbox"/> przekształca wzory, stosując działania na wyrażeniach wymiernych; wyznacza z danego wzoru wskazaną zmienną
<input type="checkbox"/> rozwiązuje równania i nierówności wymierne
<input type="checkbox"/> znajduje współrzędne punktów wspólnych hiperboli i prostej
<input type="checkbox"/> rozwiązuje algebraicznie i graficznie układy równań, w których występują wyrażenia wymierne
<input type="checkbox"/> rozwiązuje układy nierówności wymiernych
<input type="checkbox"/> wyznacza dziedzinę i miejsce zerowe funkcji wymiernej danej wzorem
<input type="checkbox"/> wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania trudniejszych zadań
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące funkcji wymiernej
<input type="checkbox"/> stosuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania równań i nierówności wymiernych w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/> zaznacza w układzie współrzędnych zbiory punktów spełniających określone warunki
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania tekstowe, wykorzystując wyrażenia wymierne, oraz zadania dotyczące związku między drogą, prędkością i czasem

Poziom **(W)**

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

<input type="checkbox"/> przekształca wzory funkcji, w których występują sumy (lub różnice) wyrażeń ze znakiem wartości bezwzględnej, szkicuje ich wykresy i podaje własności
<input type="checkbox"/> stosuje własności hiperboli do rozwiązywania zadań

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> wyznacza liczbę rozwiązań równań $ f(x) = m$, $f(x) = m$ i $ f(x) = m$, gdzie f jest funkcją homograficzną, w zależności od parametru m |
| <input type="checkbox"/> stosuje funkcje wymierne do rozwiązywania zadań z parametrem o podwyższonym stopniu trudności |

TRYGONOMETRIA

Poziom **(K)** lub **(P)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> wykorzystuje wzory na przekątną kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego
<input type="checkbox"/> oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym o danych długościach boków
<input type="checkbox"/> podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów: 30° , 45° , 60°
<input type="checkbox"/> odczytuje z tablic wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta ostrego
<input type="checkbox"/> odczytuje z tablic miarę kąta ostrego, gdy zna wartość jego funkcji trygonometrycznej
<input type="checkbox"/> oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, gdy dany jest sinus lub cosinus kąta
<input type="checkbox"/> rozwiązuje trójkąty prostokątne w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania prostych zadań praktycznych
<input type="checkbox"/> wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kąta wypukłego, gdy dane są współrzędne punktu leżącego na jego końcowym ramieniu; przedstawia ten kąt na rysunku
<input type="checkbox"/> stosuje wzory: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ $\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{ctg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha$ do obliczania wartości wyrażenia
<input type="checkbox"/> oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów rozwartych, korzystając z tablic wartości funkcji trygonometrycznych
<input type="checkbox"/> zaznacza w układzie współrzędnych kąt, gdy dana jest wartość jego funkcji trygonometrycznej
<input type="checkbox"/> stosuje w zadaniach wzór na pole trójkąta: $P = \frac{1}{2}ah$ oraz wzór na pole trójkąta równobocznego o boku a : $P = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$
<input type="checkbox"/> rozróżnia czworokąty: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez oraz zna ich własności
<input type="checkbox"/> wykorzystuje w zadaniach wzory na pola czworokątów w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> wykorzystuje funkcje trygonometryczne do obliczania obwodów i pól podstawowych figur płaskich w prostych przypadkach

Poziom **(R)** lub **(D)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> wyznacza w trudniejszych przypadkach długości odcinków w trójkącie, korzystając z twierdzenia Pitagorasa |
|---|

<input type="checkbox"/>	wyprowadza zależności ogólne, np. dotyczące długości przekątnej kwadratu i wysokości trójkąta równobocznego
<input type="checkbox"/>	wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych w bardziej złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/>	uzasadnia proste zależności, korzystając z własności funkcji trygonometrycznych
<input type="checkbox"/>	stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania trójkątów i w zadaniach praktycznych
<input type="checkbox"/>	stosuje poznane związki do upraszczania wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne
<input type="checkbox"/>	uzasadnia związki między funkcjami trygonometrycznymi kątów ostrych α i $90^\circ - \alpha$
<input type="checkbox"/>	wyprowadza wzór na jedynekę trygonometryczną oraz pozostałe związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta
<input type="checkbox"/>	przekształca w trudniejszych przypadkach wyrażenia trygonometryczne, stosując związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta
<input type="checkbox"/>	oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, gdy dany jest tangens lub cotangens kąta
<input type="checkbox"/>	uzasadnia, że podana równość jest tożsamością trygonometryczną
<input type="checkbox"/>	wykorzystuje związki między funkcjami trygonometrycznymi do rozwiązywania zadań
<input type="checkbox"/>	stosuje podczas rozwiązywania zadań wzór na pole trójkąta $P = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$
<input type="checkbox"/>	wyprowadza wzór $P = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$
<input type="checkbox"/>	oblicza pola czworokątów w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/>	wykorzystuje umiejętność wyznaczania pól trójkątów do obliczania pól innych wielokątów
<input type="checkbox"/>	uzasadnia niektóre własności czworokątów

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

<input type="checkbox"/>	przeprowadza dowód twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa
<input type="checkbox"/>	uzasadnia związki miarowe w czworokątach
<input type="checkbox"/>	rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności z zastosowaniem trygonometrii, w tym zadania na dowodzenie związków miarowych w trójkątach i czworokątach

PLANIMETRIA

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/>	rozpoznaje kąty środkowe w okręgu
<input type="checkbox"/>	oblicza długość okręgu i długość łuku okręgu w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/>	określa wzajemne położenie dwóch okręgów, gdy dane są promienie tych okręgów oraz odległość między ich środkami

<input type="checkbox"/> wykorzystuje styczność okręgów do rozwiązywania zadań w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> oblicza pole koła i pole wycinka koła
<input type="checkbox"/> oblicza pole figury, stosując wzór na pole koła, i pole wycinka koła w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> określa wzajemne położenie okręgu i prostej, porównując odległość jego środka od prostej z promieniem okręgu
<input type="checkbox"/> rozpoznaje kąty wpisane w okrąg oraz wskazuje łuki, na których są one oparte
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym, opartych na tym samym łuku oraz wnioski z tego twierdzenia w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na trójkącie równobocznym lub prostokątnym
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na dowolnym trójkącie w zadaniach z planimetrii w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny lub prostokątny
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w dowolny trójkąt w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> sprawdza, czy na danym czworokącie można opisać okrąg
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o okręgu opisanym na czworokącie do rozwiązywania zadań w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> sprawdza, czy w dany czworokąt można wpisać okrąg
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt do rozwiązywania zadań w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> opisuje własności wielokątów foremnych
<input type="checkbox"/> oblicza miarę kąta wewnętrznego danego wielokąta foremnego
<input type="checkbox"/> wyznacza liczbę boków wielokąta foremnego, znając sumę miar jego kątów wewnętrznych
<input type="checkbox"/> oblicza promień okręgu opisanego na wielokącie foremnym i wpisanego w wielokąt foremny w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie sinusów do rozwiązywania trójkątów w prostych przypadkach, także osadzonych w kontekście praktycznym
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie cosinusów do rozwiązywania trójkątów w prostych przypadkach, także osadzonych w kontekście praktycznym
<input type="checkbox"/> wskazuje najmniejszy (największy) kąt w trójkącie, znając długości boków trójkąta

Poziom **(R)** lub **(D)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> wykorzystuje styczność okręgów do rozwiązywania zadań w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/> oblicza pole figury, stosując wzory na pole koła i pole wycinka kołowego
<input type="checkbox"/> wykorzystuje twierdzenie o odcinkach stycznych do rozwiązywania zadań

<input type="checkbox"/> korzysta z własności stycznej do okręgu do rozwiązywania zadań
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o kątach środkowym i wpisanym, opartych na tym samym łuku oraz wnioski z tego twierdzenia w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o cięciwach do wyznaczania długości odcinków w okręgach
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na trójkącie
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na czworokącie
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w czworokąt
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie sinusów i cosinusów do rozwiązywania trójkątów oraz do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym
<input type="checkbox"/> przeprowadza dowód twierdzenia o kątach środkowym i wpisanym w okręgu, opartych na tym samym łuku

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

<input type="checkbox"/> przeprowadza dowód twierdzenia o cięciwach w okręgu
<input type="checkbox"/> udowadnia zależności w trójkątach i czworokątach o podwyższonym stopniu trudności
<input type="checkbox"/> udowadnia zależności w wielokątach foremnych o podwyższonym stopniu trudności, także z zastosowaniem trygonometrii
<input type="checkbox"/> przeprowadza dowód twierdzenia sinusów i dowód twierdzenia cosinusów
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania z planimetrii z zastosowaniem trygonometrii o podwyższonym stopniu trudności

FUNKCJA WYKŁADNICZA I FUNKCJA LOGARYTMICZNA

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o danej podstawie i wykładniku rzeczywistym
<input type="checkbox"/> upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> oblicza wartości funkcji wykładniczej dla podanych argumentów
<input type="checkbox"/> sprawdza, czy podany punkt należy do wykresu danej funkcji wykładniczej
<input type="checkbox"/> wyznacza wzór funkcji wykładniczej na podstawie współrzędnych punktu należącego do wykresu tej funkcji oraz szkicuje ten wykres
<input type="checkbox"/> szkicuje wykres funkcji wykładniczej i podaje jej własności
<input type="checkbox"/> szkicuje wykres funkcji wykładniczej, stosując przesunięcie o wektor albo symetrię względem osi układu współrzędnych, i podaje jej własności
<input type="checkbox"/> oblicza logarytm danej liczby
<input type="checkbox"/> stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do prostych obliczeń

<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenia o logarytmie iloczynu, ilorazu oraz potęgi do obliczania wartości wyrażeń z logarytmami w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> szkicuje wykres funkcji logarytmicznej i określa jej własności
<input type="checkbox"/> oblicza podstawę logarytmu we wzorze funkcji logarytmicznej, znając współrzędne punktu należącego do wykresu tej funkcji
<input type="checkbox"/> wyznacza zbiór wartości funkcji logarytmicznej o podanej dziedzinie
<input type="checkbox"/> szkicuje wykres funkcji logarytmicznej, stosując przesunięcie o wektor albo symetrię względem osi układu współrzędnych
<input type="checkbox"/> szkicuje w prostych przypadkach wykresy funkcji $y = f(x) $, $y = f(x)$, gdy dany jest wykres funkcji wykładniczej lub logarytmicznej $y = f(x)$
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o zmianie podstawy logarytmu przy przekształcaniu wyrażeń z logarytmami w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> wykorzystuje funkcje wykładniczą i logarytmiczną do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym w prostych przypadkach

Poziom **(R)** lub **(D)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach w bardziej złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> porównuje liczby przedstawione w postaci potęg w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/> podaje przybliżone wartości logarytmów dziesiętnych z wykorzystaniem tablic
<input type="checkbox"/> wyznacza podstawę logarytmu lub liczbę logarytmowaną, gdy dana jest wartość logarytmu, podaje odpowiednie założenia dla podstawy logarytmu oraz liczby logarytmowanej
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o logarytmie iloczynu, ilorazu i potęgi do uzasadniania równości wyrażeń
<input type="checkbox"/> szkicuje wykresy funkcji wykładniczej lub logarytmicznej otrzymane w wyniku złożenia kilku przekształceń, w tym wykresy funkcji $y = f(x) $, $y = f(x)$ w trudniejszych przypadkach
<input type="checkbox"/> rozwiązuje proste równania wykładnicze, korzystając z wykresu i własności funkcji wykładniczej
<input type="checkbox"/> rozwiązuje proste nierówności wykładnicze, korzystając z wykresu i monotoniczności funkcji wykładniczej
<input type="checkbox"/> rozwiązuje proste równania i nierówności logarytmiczne, korzystając z wykresu i własności funkcji logarytmicznej
<input type="checkbox"/> wykorzystuje własności funkcji wykładniczej i logarytmicznej do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym, np. dotyczące wzrostu wykładniczego i rozpadu promieniotwórczego
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące funkcji wykładniczej lub logarytmicznej

<input type="checkbox"/> zaznacza w układzie współrzędnych zbiory punktów opisanych z wykorzystaniem funkcji wykładniczej i logarytmicznej
<input type="checkbox"/> wykorzystuje twierdzenie o zmianie podstawy logarytmu w zadaniach na dowodzenie
<input type="checkbox"/> udowadnia twierdzenie dotyczące niewymierności liczby np. $\log_2 3$

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K)–(D) oraz:

<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji wykładniczej i logarytmicznej
<input type="checkbox"/> udowadnia twierdzenia o logarytmach, w szczególności twierdzenie o działaniach na logarytmach i twierdzenie o zmianie podstawy logarytmu

FUNKCJE TRYGNOMETRYCZNE

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

• oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dane są współrzędne punktu leżącego na jego końcowym ramieniu
• zaznacza kąt w układzie współrzędnych
• określa znaki funkcji trygonometrycznych danego kąta
• oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów: 90° , 120° , 135° , 150°
• określa położenie końcowego ramienia kąta na podstawie informacji o wartościach funkcji trygonometrycznych tego kąta
• wykorzystuje funkcje trygonometryczne – w prostych przypadkach
• zapisuje miarę danego kąta w postaci $k \cdot 360^\circ + \alpha$, $k \in \mathbf{Z}$
• zamienia miarę stopniową na miarę łukową i odwrotnie
• odczytuje okres podstawowy funkcji z jej wykresu
• szkicuje wykresy funkcji trygonometrycznych w danym przedziale i określa ich własności
• szkicuje wykres funkcji $y = f(x - p) + q$, gdzie f jest funkcją trygonometryczną, i określa jej własności
• szkicuje wykres funkcji, stosując symetrię względem osi OX
• szkicuje wykresy funkcji $y = a f(x)$ oraz $y = f(x) $, gdzie f jest funkcją trygonometryczną, i określa ich własności – w prostych przypadkach
• uzasadnia proste tożsamości trygonometryczne, podaje odpowiednie założenia
• oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, znając wartość funkcji sinus lub cosinus
• wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kątów z zastosowaniem wzorów na funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów
• stosuje wzory na funkcje trygonometryczne podwojonego kąta – w prostych przypadkach
• zapisuje dany kąt w postaci $k \cdot \frac{\pi}{2} \pm \alpha$ lub $k \cdot 90^\circ \pm \alpha$, gdzie $k \in \mathbf{Z}$
• stosuje wzory redukcyjne do obliczania wartości funkcji trygonometrycznych danych kątów

<ul style="list-style-type: none"> ● rozwiązuje proste równania i nierówności trygonometryczne
<ul style="list-style-type: none"> ● posługuje się tablicami lub kalkulatorem do wyznaczania miary kąta w podanym przedziale, znając wartość jednej z jego funkcji trygonometrycznych

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<ul style="list-style-type: none"> ● oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: -90°, 315°, 1080°
<ul style="list-style-type: none"> ● stosuje w zadaniach funkcje trygonometryczne – w trudniejszych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> ● wyznacza kąt, mając daną wartość jednej z jego funkcji trygonometrycznych – w trudniejszych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> ● szkicuje wykres funkcji okresowej
<ul style="list-style-type: none"> ● stosuje okresowość funkcji do wyznaczania jej wartości
<ul style="list-style-type: none"> ● stosuje własności funkcji trygonometrycznej do obliczania jej wartości dla kąta o podanej mierze łukowej
<ul style="list-style-type: none"> ● szkicuje wykresy funkcji $y = f(ax)$ oraz $y = f(x)$, gdzie $y = f(x)$ jest funkcją trygonometryczną, i określa ich własności
<ul style="list-style-type: none"> ● na podstawie wykresów funkcji trygonometrycznych szkicuje wykresy funkcji będące efektem wykonania kilku przekształceń; określa ich własności
<ul style="list-style-type: none"> ● stosuje w zadaniach wykresy funkcji trygonometrycznych
<ul style="list-style-type: none"> ● oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, znając wartość funkcji tangens lub cotangens
<ul style="list-style-type: none"> ● udowadnia tożsamości trygonometryczne, podaje odpowiednie założenia – w trudniejszych zadaniach
<ul style="list-style-type: none"> ● stosuje wzory na funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów, podwojonego kąta do przekształcania wyrażeń, w tym do uzasadniania tożsamości trygonometrycznych – w trudniejszych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> ● stosuje wzory redukcyjne do upraszczania wyrażeń i udowadniania tożsamości trygonometrycznych
<ul style="list-style-type: none"> ● stosuje związki między funkcjami trygonometrycznymi do rozwiązywania trudniejszych równań i nierówności trygonometrycznych, wyznaczania zbioru wartości funkcji złożonej i obliczania wartości funkcji trygonometrycznych połowy kąta

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz:

<ul style="list-style-type: none"> ● wyprowadza wzory na funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów oraz funkcje podwojonego kąta
<ul style="list-style-type: none"> ● rozwiązuje zadania dotyczące funkcji trygonometrycznych – o znacznym stopniu trudności
<ul style="list-style-type: none"> ● rozwiązuje nierówności trygonometryczne, stosując odpowiednie podstawienia

GEOMETRIA ANALITYCZNA

Poziom **(K)** lub **(P)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

• oblicza odległość między punktami w układzie współrzędnych
• stosuje wzór na odległość między punktami w zadaniach dotyczących wielokątów – w prostych przypadkach
• wyznacza współrzędne środka odcinka, gdy dane są współrzędne jego końców
• stosuje wzory na współrzędne środka odcinka do rozwiązywania zadań – w prostych przypadkach
• oblicza odległość punktu od prostej i odległość między prostymi równoległymi
• stosuje wzór na odległość punktu od prostej do rozwiązywania zadań – w prostych przypadkach
• podaje równanie okręgu o danym środku i promieniu
• podaje współrzędne środka i promień okręgu, gdy dane jest jego równanie w postaci kanonicznej lub postaci ogólnej
• wyznacza równanie okręgu o danym środku, przechodzącego przez dany punkt
• podaje liczbę punktów wspólnych i określa wzajemne położenie okręgu i prostej opisanych danymi równaniami
• opisuje koło w układzie współrzędnych
• sprawdza, czy punkt należy do danego okręgu (koła)
• rozwiązuje algebraicznie układy równań drugiego stopnia i podaje ich interpretację geometryczną
• wykonuje działania na wektorach
• sprawdza, czy wektory są równoległe
• stosuje działania na wektorach do badania współliniowości punktów
• stosuje działania na wektorach do podziału odcinka
• wykorzystuje działania na wektorach do rozwiązywania prostych zadań dotyczących wielokątów w układzie współrzędnych
• rozpoznaje figury osiowosymetryczne i środkowosymetryczne
• wyznacza współrzędne obrazów punktów oraz wierzchołków wielokąta w symetrii osiowej lub symetrii środkowej względem osi układu współrzędnych lub początku układu współrzędnych

Poziom **(R)** lub **(D)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

• wyznacza równanie krzywej, do której należą punkty równo odległe od punktu i od prostej
• stosuje własności stycznej do okręgu do rozwiązywania zadań – w trudniejszych przypadkach
• stosuje wzory na odległość między punktami i środek odcinka do rozwiązywania zadań dotyczących wielokątów – w trudniejszych przypadkach
• sprawdza, czy dane równanie jest równaniem okręgu

<ul style="list-style-type: none"> • wyznacza wartość parametru tak, aby dane równanie opisywało okrąg
<ul style="list-style-type: none"> • stosuje równanie okręgu do rozwiązywania zadań, w tym do wyznaczania równania okręgu opisanego na trójkącie
<ul style="list-style-type: none"> • określa wzajemne położenie dwóch okręgów opisanych danymi równaniami
<ul style="list-style-type: none"> • wykorzystuje wzajemne położenie okręgów w prostych zadaniach z parametrem
<ul style="list-style-type: none"> • stosuje układy równań drugiego stopnia w zadaniach różnych typów
<ul style="list-style-type: none"> • podaje geometryczną interpretację rozwiązania układu nierówności drugiego stopnia
<ul style="list-style-type: none"> • opisuje układem nierówności przedstawiony podzbiór płaszczyzny
<ul style="list-style-type: none"> • stosuje w zadaniach działania na wektorach oraz ich interpretację geometryczną – w bardziej złożonych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> • stosuje własności symetrii osiowej i symetrii środkowej – w bardziej złożonych przypadkach

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz:

<ul style="list-style-type: none"> • wykorzystuje działania na wektorach w zadaniach na dowodzenie
<ul style="list-style-type: none"> • rozwiązuje zadania z geometrii analitycznej o znacznym stopniu trudności

CIĄGI

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<ul style="list-style-type: none"> • wyznacza kolejne wyrazy ciągu, gdy danych jest kilka jego początkowych wyrazów
<ul style="list-style-type: none"> • wyznacza wyrazy ciągu opisanego słownie
<ul style="list-style-type: none"> • szkicuje wykres ciągu
<ul style="list-style-type: none"> • wyznacza wzór ogólny ciągu, gdy danych jest kilka jego początkowych wyrazów
<ul style="list-style-type: none"> • wyznacza wyrazy ciągu spełniające dany warunek (np. przyjmujące daną wartość) – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> • podaje przykłady ciągów monotonicznych, których wyrazy spełniają podane warunki
<ul style="list-style-type: none"> • uzasadnia, że dany ciąg nie jest monotoniczny
<ul style="list-style-type: none"> • wyznacza wyraz a_{n+1} ciągu określonego wzorem ogólnym
<ul style="list-style-type: none"> • bada monotoniczność ciągu – w prostszych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> • wyznacza początkowe wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym lub określonego rekurencyjnie oraz wzór rekurencyjny ciągu, gdy dany jest wzór ogólny – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> • wyznacza wzór ogólny ciągu, będącego sumą, różnicą, iloczynem lub ilorazem danych ciągów, i bada ich monotoniczność – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> • podaje przykłady ciągów arytmetycznych
<ul style="list-style-type: none"> • wyznacza wyrazy ciągu arytmetycznego, gdy dane są jego pierwszy wyraz i różnica
<ul style="list-style-type: none"> • określa monotoniczność ciągu arytmetycznego
<ul style="list-style-type: none"> • wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, gdy dane są dwa jego wyrazy
<ul style="list-style-type: none"> • stosuje związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego do wyznaczania wyrazów ciągu arytmetycznego
<ul style="list-style-type: none"> • sprawdza, czy dany ciąg jest arytmetyczny – w prostych przypadkach

• oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
• podaje przykłady ciągów geometrycznych
• wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, gdy dane są jego pierwszy wyraz i iloraz
• wyznacza wzór ogólny ciągu geometrycznego, gdy dane są dwa jego wyrazy
• określa monotoniczność ciągu geometrycznego
• sprawdza, czy dany ciąg jest geometryczny – w prostych przypadkach
• oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
• wyznacza wartości niewiadomych tak, aby wraz z danymi liczbami tworzyły ciąg arytmetyczny lub geometryczny – w prostych przypadkach
• stosuje własności ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego w zadaniach różnego typu – w prostych przypadkach
• oblicza wysokość kapitału przy różnych okresach kapitalizacji
• oblicza oprocentowanie lokaty i okres oszczędzania – w prostych przypadkach
• ustala na podstawie wykresu, czy dany ciąg ma granicę, a w przypadku ciągu zbieżnego podaje jej wartość
• ustala liczbę wyrazów danego ciągu oddalonych od danej liczby o podaną wartość oraz liczbę wyrazów większych (mniejszych) od danej wartości – w prostych przypadkach
• podaje granice ciągów $a_n = q^n$, gdy $q \in (-1; 1)$, $a_n = \frac{1}{n^k}$, gdy $k > 0$ oraz $a_n = \sqrt[n]{a}$, gdy $a > 0$
• rozpoznaje ciąg rozbieżny na podstawie wykresu i określa, czy ma on granicę niewłaściwą, czy nie ma granicy
• stosuje twierdzenie o rozbieżności ciągów: $a_n = q^n$ dla $q > 1$ oraz $a_n = n^k$ dla $k > 0$
• oblicza granice ciągów, korzystając z twierdzeń o granicach ciągów zbieżnych i rozbieżnych – w prostych przypadkach
• sprawdza, czy dany szereg geometryczny jest zbieżny
• oblicza sumę szeregu geometrycznego – w prostych przypadkach

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

• wyznacza wzór ogólny ciągu spełniającego podane warunki – w trudniejszych przypadkach
• bada monotoniczność ciągów
• rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące monotoniczności ciągu
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności związane ze wzorem rekurencyjnym ciągu
• rozwiązuje równania z zastosowaniem wzorów na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego – w trudniejszych przypadkach
• stosuje związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego w zadaniach różnego typu
• uzasadnia wzory, stosując wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
• stosuje w zadaniach własności ciągów arytmetycznego i geometrycznego, w tym wzory na sumę n początkowych wyrazów tych ciągów, również osadzonych w kontekście praktycznym i na dowodzenie

<ul style="list-style-type: none"> rozwiązuje zadania związane z lokatami dotyczące okresu oszczędzania, wysokości oprocentowania oraz zadania związane z kredytami
<ul style="list-style-type: none"> oblicza granice ciągów, korzystając z twierdzeń o granicach ciągów zbieżnych i rozbieżnych – w trudniejszych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> stosuje wzory na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego do obliczania granic ciągów
<ul style="list-style-type: none"> uzasadnia, że dany ciąg nie ma granicy
<ul style="list-style-type: none"> oblicza granice ciągów, stosując twierdzenie o trzech ciągach
<ul style="list-style-type: none"> wyznacza wartości zmiennej, dla której szereg jest zbieżny
<ul style="list-style-type: none"> stosuje wzór na sumę szeregu geometrycznego w zadaniach dotyczących własności ciągów
<ul style="list-style-type: none"> rozwiązuje równania, stosując wzór na sumę szeregu geometrycznego
<ul style="list-style-type: none"> zamienia ułamek okresowy na ułamek zwykły

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz:

<ul style="list-style-type: none"> rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące ciągów, w szczególności monotoniczności ciągu
<ul style="list-style-type: none"> rozwiązuje zadania dotyczące długości krzywych, stosując wzór na sumę szeregu geometrycznego
<ul style="list-style-type: none"> wyznacza granicę ciągu w zależności od wartości parametru
<ul style="list-style-type: none"> uzasadnia istnienie granicy niewłaściwej

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<ul style="list-style-type: none"> uzasadnia, że funkcja nie ma granicy w punkcie. np. na podstawie jej wykresu – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> oblicza granice funkcji w punkcie, korzystając z twierdzeń o granicach – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> oblicza granice jednostronne funkcji w punkcie – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> wyznacza granice niewłaściwe funkcji w punkcie – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> wyznacza granice niewłaściwe jednostronne funkcji w punkcie – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> wyznacza granice funkcji w nieskończoności – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> wyznacza równania asymptot pionowych i poziomych wykresu funkcji – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> sprawdza, czy funkcja jest ciągła w danym punkcie – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> oblicza pochodną funkcji w punkcie, korzystając z jej definicji – w prostych przypadkach
<ul style="list-style-type: none"> stosuje interpretację geometryczną pochodnej funkcji w punkcie do wyznaczania współczynnika kierunkowego stycznej do wykresu funkcji w punkcie i oblicza miarę kąta, jaki ta styczna tworzy z osią OX – w prostych przypadkach

• wyznacza równanie stycznej do wykresu funkcji w danym punkcie
• wyznacza funkcję pochodną wielomianów i oblicza jej wartość w danym punkcie
• stosuje twierdzenie o pochodnej sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji do wyznaczania funkcji pochodnej oraz pochodnej funkcji – w prostych przypadkach
• wyznacza wzór funkcji złożonej i jej dziedzinę – w prostych przypadkach
• stosuje pochodną funkcji do wyznaczania prędkości oraz przyspieszenia poruszających się ciał – w prostych przypadkach
• korzysta z własności pochodnej do wyznaczania przedziałów monotoniczności wielomianów
• podaje ekstremum funkcji, korzystając z jej wykresu
• wyznacza ekstrema wielomianów, stosując warunki konieczny i wystarczający istnienia ekstremum
• uzasadnia, że dany wielomian nie ma ekstremum
• wyznacza najmniejszą i największą wartość wielomianu w przedziale domkniętym – w prostych przypadkach
• rozwiązuje zadania optymalizacyjne – w prostych przypadkach
• podaje i stosuje schemat badania własności funkcji
• szkicuje wykres wielomianu na podstawie badania jego własności

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

• uzasadnia, że funkcja nie ma granicy w punkcie
• uzasadnia, że dana liczba jest granicą funkcji w punkcie
• oblicza granicę funkcji w punkcie, również granice funkcji w postaci $y = \sqrt{f(x)}$ oraz granice funkcji trygonometrycznych
• stosuje twierdzenie o związku między wartościami granic jednostronnych w punkcie a granicą funkcji w punkcie
• oblicza granice funkcji w nieskończoności
• wyznacza równania asymptot pionowych i poziomych wykresu funkcji – w trudniejszych przypadkach
• bada ciągłość funkcji
• wyznacza wartości parametrów, dla których funkcja jest ciągła w danym punkcie lub przedziale
• stosuje własność Darboux do uzasadniania istnienia miejsca zerowego funkcji i wyznaczania jego przybliżonej wartości
• oblicza pochodną funkcji w punkcie, korzystając z jej definicji – w trudniejszych przypadkach
• stosuje interpretację geometryczną pochodnej funkcji w punkcie do wyznaczania współczynnika kierunkowego stycznej do wykresu funkcji w punkcie; oblicza kąt, jaki ta styczna tworzy z osią OX – w trudniejszych przypadkach
• uzasadnia istnienie pochodnej funkcji w punkcie
• stosuje twierdzenia o pochodnej sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji do wyznaczania funkcji pochodnej oraz obliczania wartości pochodnej funkcji w punkcie
• wyznacza współrzędne punktu, w którym styczna do wykresu funkcji spełnia podane warunki

• wyznacza pochodne funkcji trygonometrycznych
• wyznacza pochodną funkcji złożonej
• stosuje interpretację fizyczną pochodnej funkcji
• wyznacza przedziały monotoniczności funkcji – w trudniejszych przypadkach
• uzasadnia monotoniczność funkcji w danym zbiorze
• wyznacza wartości parametrów tak, aby funkcja była monotoniczna
• wyznacza ekstrema funkcji, stosując warunki konieczny i wystarczający istnienia ekstremum – w trudniejszych przypadkach
• uzasadnia, że funkcja nie ma ekstremum
• rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące ekstremów funkcji
• wyznacza wartości funkcji najmniejszą i największą w przedziale domkniętym
• rozwiązuje zadania optymalizacyjne
• bada własności funkcji i szkicuje jej wykres

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz:

• wyprowadza wzory na pochodne funkcji
• wyprowadza wzory na pochodną sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji
• wyznacza równania asymptot ukośnych wykresu funkcji
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, wykorzystując pochodną i jej własności

STATYSTYKA

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

• oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę zestawu danych
• odczytuje informacje ze skali centylowej – w prostych przypadkach
• oblicza wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych
• oblicza średnią ważoną liczb z podanymi wagami

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

• oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę danych przedstawionych różnymi sposobami
• odczytuje informacje ze skali centylowej – w trudniejszych przypadkach
• wykorzystuje w zadaniach średnią arytmetyczną, medianę, dominantę i średnią ważoną – w trudniejszych przypadkach
• oblicza wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych przedstawionych różnymi sposobami

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę danych pogrupowanych różnymi sposobami |
| <ul style="list-style-type: none"> • rozwiązuje zadania dotyczące statystyki – w trudniejszych przypadkach |

Poziom **(W)**

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące statystyki |
|--|

RACHUNEK PRAWDOPODOBIENSTWA

Poziom **(K)** lub **(P)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> wypisuje wszystkie możliwe wyniki danego doświadczenia
<input type="checkbox"/> stosuje regułę mnożenia do wyznaczenia liczby wyników doświadczenia spełniających dany warunek – w typowych sytuacjach
<input type="checkbox"/> przedstawia drzewo ilustrujące wyniki danego doświadczenia – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> wypisuje wszystkie możliwe permutacje danego zbioru
<input type="checkbox"/> wykonuje obliczenia, stosując definicję silni
<input type="checkbox"/> oblicza liczbę permutacji danego zbioru – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza liczbę wariacji bez powtórzeń – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza liczbę wariacji z powtórzeniami – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza wartość symbolu Newtona
<input type="checkbox"/> oblicza liczbę kombinacji – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> stosuje regułę dodawania do obliczania liczby wyników spełniających dany warunek – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> wykorzystuje podstawowe pojęcia kombinatoryki do rozwiązywania zadań o niewielkim stopniu trudności
<input type="checkbox"/> określa przestrzeń (zbiór) zdarzeń elementarnych dla danego doświadczenia
<input type="checkbox"/> wypisuje wyniki sprzyjające danemu zdarzeniu losowemu
<input type="checkbox"/> określa zdarzenia: przeciwne, niemożliwe, pewne i wykluczające się
<input type="checkbox"/> wyznacza sumę, iloczyn i różnicę zdarzeń losowych – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> stosuje klasyczną definicję prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych – w typowych sytuacjach
<input type="checkbox"/> podaje rozkład prawdopodobieństwa dla rzutu kostką
<input type="checkbox"/> oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza prawdopodobieństwo warunkowe – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> sprawdza, czy są spełnione założenia twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym – w prostych sytuacjach

<input type="checkbox"/> oblicza prawdopodobieństwo całkowite – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> stosuje wzór Bayesa do obliczania prawdopodobieństwa przyczyny – w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> ilustruje doświadczenie wieloetapowe za pomocą drzewa
<input type="checkbox"/> oblicza prawdopodobieństwo sukcesu i porażki w pojedynczej próbie Bernoulliego
<input type="checkbox"/> stosuje wzór Bernoulliego do obliczenia prawdopodobieństwa otrzymania k sukcesów w n próbach – w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> podaje rozkład zmiennej losowej i przedstawia go za pomocą tabeli – w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> oblicza wartość oczekiwaną zmiennej losowej – w prostych przypadkach
<input type="checkbox"/> rozstrzyga, czy gra jest sprawiedliwa

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> stosuje regułę mnożenia i regułę dodawania do obliczania liczby wyników doświadczenia spełniających dany warunek – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza liczbę permutacji danego zbioru – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza liczbę wariacji bez powtórzeń – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza liczbę wariacji z powtórzeniami – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza liczbę kombinacji – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> stosuje własności trójkąta Pascala
<input type="checkbox"/> wykorzystuje wzór dwumianowy Newtona do rozwinięcia wyrażeń postaci $(a + b)^n$ i wyznaczenia współczynników wielomianów
<input type="checkbox"/> uzasadnia zależności, w których występuje symbol Newtona
<input type="checkbox"/> stosuje klasyczną definicję prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> stosuje własności prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń
<input type="checkbox"/> stosuje własności prawdopodobieństwa w dowodach twierdzeń
<input type="checkbox"/> oblicza prawdopodobieństwo warunkowe – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza prawdopodobieństwo całkowite – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> ilustruje doświadczenia wieloetapowe za pomocą drzewa i na tej podstawie oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń
<input type="checkbox"/> stosuje wzór Bayesa do obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia
<input type="checkbox"/> stosuje wzór Bernoulliego do obliczenia prawdopodobieństwa otrzymania k sukcesów w n próbach – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> stosuje wzór Bernoulliego do obliczenia prawdopodobieństwa otrzymania co najmniej k sukcesów w n próbach
<input type="checkbox"/> podaje rozkład zmiennej losowej – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza wartość oczekiwaną zmiennej losowej – w trudnych przypadkach

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> rozstrzyga, czy gra jest sprawiedliwa – w złożonych sytuacjach |
|---|

Poziom **(W)**

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów od (K) do (D) oraz:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące własności prawdopodobieństwa |
| <input type="checkbox"/> udowadnia wzór Bayesa |
| <input type="checkbox"/> stosuje własności prawdopodobieństwa w dowodach twierdzeń |

GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

Poziom **(K)** lub **(P)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> wskazuje w wielościanie proste prostopadłe, równoległe i skośne |
| <input type="checkbox"/> wskazuje w wielościanie rzut prostokątny danego odcinka na daną płaszczyznę |
| <input type="checkbox"/> określa liczbę ścian, wierzchołków i krawędzi wielościanu; sprawdza, czy istnieje graniastosłup o danej liczbie krawędzi |
| <input type="checkbox"/> wskazuje elementy charakterystyczne wielościanu (np. wierzchołek ostrosłupa) |
| <input type="checkbox"/> oblicza pole powierzchni bocznej i całkowitej graniastosłupa i ostrosłupa |
| <input type="checkbox"/> rysuje siatkę wielościanu na podstawie jej fragmentu |
| <input type="checkbox"/> oblicza długości przekątnych graniastosłupa prostego – w prostych przypadkach |
| <input type="checkbox"/> oblicza objętość graniastosłupa prostego i ostrosłupa prawidłowego |
| <input type="checkbox"/> wskazuje kąt między przekątną graniastosłupa a płaszczyznę jego podstawy |
| <input type="checkbox"/> wskazuje kąty między odcinkami w ostrosłupie a płaszczyznę jego podstawy – w prostych przypadkach |
| <input type="checkbox"/> wskazuje kąt między sąsiednimi ścianami wielościanu – w prostych przypadkach |
| <input type="checkbox"/> rozwiązuje typowe zadania dotyczące kąta między prostą a płaszczyznę |
| <input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o trzech prostych prostopadłych do uzasadniania prostopadłości prostych w prostopadłościanach |
| <input type="checkbox"/> stosuje funkcje trygonometryczne do obliczania pola powierzchni i objętości wielościanu – w typowych sytuacjach |
| <input type="checkbox"/> na rysunku prostopadłościanu (sześciianu) i ostrosłupa prawidłowego zaznacza ich przekroje – w prostych sytuacjach |
| <input type="checkbox"/> oblicza pole danego przekroju graniastosłupa lub ostrosłupa prawidłowego – w prostych sytuacjach |

Poziom **(R)** lub **(D)**

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> przeprowadza wnioskowania dotyczące położenia prostych w przestrzeni |
| <input type="checkbox"/> przeprowadza dowód twierdzenia o prostej prostopadłej |

<input type="checkbox"/> stosuje i przekształca wzory na pola powierzchni i objętości wielościanów
<input type="checkbox"/> stosuje funkcje trygonometryczne i twierdzenia planimetrii do obliczenia pola powierzchni i objętości wielościanu – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> oblicza miarę kąta dwuściennego między ścianami wielościanu oraz między ścianą wielościanu a jego przekrojem (również z wykorzystaniem trygonometrii)
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące miary kąta między prostą a płaszczyzną (również z wykorzystaniem trygonometrii)
<input type="checkbox"/> oblicza pola przekrojów prostopadłościanu i ostrosłupa prawidłowego (również z wykorzystaniem trygonometrii)
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o trzech prostych prostopadłych do uzasadniania prostopadłości prostych
<input type="checkbox"/> przeprowadza dowód twierdzenia o trzech prostych prostopadłych
<input type="checkbox"/> stosuje twierdzenie o trzech prostych prostopadłych do rozwiązywania zadań
<input type="checkbox"/> oblicza pola przekrojów prostopadłościanu lub ostrosłupa prawidłowego (również z wykorzystaniem trygonometrii) – w złożonych sytuacjach

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów od (K) do (D) oraz:

<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów oraz ich przekrojów (również z wykorzystaniem trygonometrii)
<input type="checkbox"/> przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących związków miarowych w wielościanach

BRYŁY OBROTOWE

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> wskazuje elementy charakterystyczne bryły obrotowej (np. kąt rozwarcia stożka)
<input type="checkbox"/> zaznacza przekrój osiowy walca i stożka oraz przekroje kuli
<input type="checkbox"/> oblicza pole powierzchni i objętość bryły obrotowej – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania dotyczące rozwinięcia powierzchni bocznej walca i stożka – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> stosuje funkcje trygonometryczne do obliczania pola powierzchni i objętości bryły obrotowej – w prostych sytuacjach
<input type="checkbox"/> wyznacza skalę podobieństwa brył podobnych – w prostych przypadkach

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> stosuje funkcje trygonometryczne i twierdzenia planimetrii

do obliczenia pola powierzchni i objętości bryły obrotowej – w złożonych sytuacjach
<input type="checkbox"/> rysuje odpowiednie przekroje i oblicza pola powierzchni i objętości brył wpisanych w kulę i opisanych na kuli
<input type="checkbox"/> rysuje odpowiednie przekroje i oblicza pola powierzchni i objętości brył wpisanych w walec i opisanych na walcu
<input type="checkbox"/> rysuje odpowiednie przekroje i oblicza pola powierzchni i objętości brył wpisanych w stożek i opisanych na stożku
<input type="checkbox"/> rysuje odpowiednie przekroje i rozwiązuje zadania dotyczące brył obrotowych i wielościanów wpisanych w inne wielościany
<input type="checkbox"/> wykorzystuje podobieństwo brył i skalę podobieństwa podczas rozwiązywania zadań
<input type="checkbox"/> opisuje funkcją jednej zmiennej pole powierzchni lub objętość bryły i określa jej dziedzinę oraz wyznacza jej największą albo najmniejszą wartość (zadania optymalizacyjne)

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów od (K) do (D) oraz:

<input type="checkbox"/> rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące brył obrotowych (również z wykorzystaniem trygonometrii)
<input type="checkbox"/> przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących związków miarowych w bryłach obrotowych
<input type="checkbox"/> wyprowadza wzory na objętość i pole powierzchni bocznej stożka ściętego

PRZYKŁADY DOWODÓW W MATEMATYCE

Poziom (K) lub (P)

Uczeń otrzymuje ocenę **dopuszczającą** lub **dostateczną**, jeśli:

<input type="checkbox"/> przeprowadza proste dowody dotyczące własności liczb całkowitych
<input type="checkbox"/> przeprowadza proste dowody, stosując metodę równoważnego przekształcania tezy
<input type="checkbox"/> przeprowadza proste dowody dotyczące własności figur płaskich

Poziom (R) lub (D)

Uczeń otrzymuje ocenę **dobrą** lub **bardzo dobrą**, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

<input type="checkbox"/> przeprowadza trudniejsze dowody dotyczące własności liczb całkowitych
<input type="checkbox"/> przeprowadza trudniejsze dowody dotyczące nierówności, wykorzystując zależność między średnią arytmetyczną a średnią geometryczną
<input type="checkbox"/> stosuje metodę równoważnego przekształcania tezy – w trudnych sytuacjach
<input type="checkbox"/> przeprowadza trudne dowody dotyczące własności figur płaskich

Poziom (W)

Uczeń otrzymuje ocenę **celującą**, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów od (K) do (D) oraz:

<input type="checkbox"/> przeprowadza dowód nie wprost (np. dotyczący liczb pierwszych)

POWTÓRZENIE

Wymagania dotyczące powtarzanych wiadomości zostały opisane w poszczególnych rozdziałach